



# Dauphine

**Aire de culture :** vallée du Lot en Amont d'Espalion, sud-Aveyron (secteur Brusque et Cornus), bordure cévenole aveyronnaise (secteur de St-Jean du Bruel), aussi appelée « Dauphinenque », très répandue sous différents clones (ou sous-variétés) dans le Tarn, le Gard, l'Hérault (« Marron d'Olargues », « Marron de St-Vincent »), l'Ardèche (« Sardonne »), la Lozère (« Marron de Villefort ») et le Var (« Marron du Var », « Marron de Collobrières ») avec parfois des différences notables d'aspect des fruits et surtout de calibre

**Porte-greffe conseillé :** Castanea sativa, Maraval, Marlhac

## Port de l'arbre



dressé



semi-dressé



étalé

## Débourrement

précoce

moyen

tardif

## Feuille



**Taille :**  petite  moyenne  grande

**Couleur :**  vert clair  vert moyen  vert foncé

**Limbe :**  aigu  obtus  cordiforme

**Incisions :**  mucronées  dentées

## Floraison



**Date de floraison :** - mâle : précoce  
- femelle : tardive

**Chaton mâle :** astaminé

**Longueur chaton :** court

## Fruit



**Couleur :** brun rougeâtre à dorée (base plus claire), brillante, stries assez marquées

**Forme :** elliptique courte à longue, côtelée

**Cicatrice :** petite à moyenne, légère pilosité

**Calibre :** moyen

**Cloisonnement :** < à 10 % (marron)

**Tan :** peu pénétrant

**Conservation :** bonne

**Epluchage :** très facile

## Récolte

**Date de chute :** semi-précoce à semi-tardive

**Déhiscence :** plutôt libre

## Utilisations

Marron consommé localement grillé ou bouilli selon le calibre, autrefois séché dans des « sécadous » pour le conserver ou le transformer en farine, également utilisé pour l'alimentation animale (ovins, porcins). Très bonne tenue en conserverie et confiserie.

## Avantages

- bel aspect visuel
- très bonnes qualités gustatives (chair fine, assez sucrée et très parfumée)
- variété assez vigoureuse et productive
- facilité d'épluchage
- assez bonne conservation

## Inconvénients

- son calibre est tout juste moyen en Aveyron, alors qu'il peut être gros dans d'autres départements plus ensoleillés (Hérault, Var, sud-Ardèche)
- sensibilité au chancre de l'écorce et à la septoriose des feuilles